

Загальні елементи технології вирощування моркви.

№ пп	Система захисту моркви	Продукт	Норма на 1 га	Термін виконання	Примітка
1	Посів насіння. Можливе поєднання з внесенням гранульованого інсектициду.	Форс 1,5 Г, г	5,0 кг/га	Під час посіву	Вибір норми витрати гранульованого інсектициду та протруйника насіння залежить від рівня ґрунтових шкідників.
2	Внесення гербіциду	Гезагард 500 FW, к. с.	2,0 л/га	3-4 дні після посіву, до появи сходів	На вологий ґрунт.
3	Внесення гербіциду	Гезагард 500 FW, к. с.	1,5 л/га	2-3 справжніх листків культури	В міру появи сходів бур'янів, 2-3 справжніх листків моркви
4	Внесення гербіциду	Гезагард 500 FW, к. с.	2,0 л/га	4-5 справжніх листків культури	В міру появи сходів бур'янів, 4-5 справжніх листків моркви
5	Внесення гербіциду	Фюзілад Форте 150 ЕС, к. е.	1,0 л/га	Без обмежень по застосуванню щодо фаз розвитку рослин моркви	При необхідності, в міру відростання бур'янів. Злакові бур'яни чутлива фаза - довжина листя до 10 см. Не допускається застосування перед внесенням гербіциду Гезагард або в суміші.
6	Внесення інсектициду. Обробку можливо поєднувати з фунгіцидом при потребі.	Карате Зеон 050 CS, мк.с.	0,2 л/га	5-6 справжніх листків культури	Фунгіцид застосовується у разі формування сприятливих для розвитку хвороби погодних умов або при появі перших ознак борошнистої роси.
7	Внесення фунгіциду в баковій суміші з інсектицидом.	Квадріс ТОП 325 SC, к. с.	0,75 л/га	Інтервал через 8-10 днів	
		Карате Зеон 050 CS, мк.с.	0,2 л/га		
8	Внесення фунгіциду. Можливо поєднувати з інсектицидом при потребі.	Циделі ТОП 140 DC, КД	1,0 л/га	Інтервал через 8-10 днів	Застосування інсектициду на данному етапі розвитку рослин, буде залежати від прогнозу розвитку шкідників.
		Енжіо 247 SC, к.с.	0,18 л/га		
9	Внесення фунгіциду в баковій суміші з інсектицидом.	Квадріс 250 SC, к. с.	0,6 л/га	Інтервал через 14-15 днів	

		Енжіо 247 SC, к.с.	0,18 л/га		
10	Внесення фунгіциду. Можливо поєднувати з інсектицидом при потребі.	Циделі ТОП 140 DC, КД.	1,0 л/га	Інтервал через 14-15 днів	Застосування інсектициду на данному етапі розвітку рослин, буде залежати від прогнозу розвітку шкідників.

Перелік обов'язкових препаратів для використання в період вирощування моркви

З метою отримання Товару (морква) з безпечним рівнем пестицидних залишків, захист моркви повинен здійснюватись із застосуванням зазначених нижче препаратів. Нижче також зазначаються норми використання препаратів на гектар та їх внесення за відповідними фазами вегетації культури згідно з регламентом застосування:

Назва препарату	Норма л/кг на 1 га	Кількість обробок у період вегетації	Фаза внесення	Термін очікування (кількість днів до збирання)	Спектор дії
Циделі Топ	1	2	У період вегетації	14	Борошниста роса, альтернаріоз