

Загальні елементи технології вирощування цибулі.

№ пп	Система захисту картоплі	Продукт	Норма на 1 га	Термін виконання	Примітка
1	При посіві насіння можливо поєднувати з внесенням гранульованого інсектициду.	Форс	10,0 кг/га	Під час посіву	Вибір норми витрати гранульованого інсектициду та протруйника насіння залежить від рівня ґрунтових шкідників та прогнозу розвитку хвороби.
2	Внесення гербіцидів одноразове або дробне.	Реглон Супер 150SL, РК Гоал Лонтрел Гранд Тотріл Фюзілад Форте 150 ЕС, к. е.	2 л /га 0,8 кг/га 0,15г/га 2,0 л/га 2л/га	Залежить від фази розвитку культури	Вибір гербіцидів та норми їх витрати залежать від спектру бур'янів та фази розвитку культури.
3	Ґрунтове застосування інсектициду.	Актара 25 WG, в. г.	0,4 кг/га	Фаза культури – Початок виходу другого справжнього листка)	Через системи краплинного зрошення.
4	<u>Перша обробка</u> Внесення фунгіциду	Прегадо R 270 WG, ВГ	4 кг/га	Інтервал Через 8-10 днів	
5	Ґрунтове застосування фунгіциду.	Юніформ 446 SE, CE	0,4 л/га	Фаза культури – Початок виходу 4-5 справжнього листка.	
6	<u>Друга обробка:</u> Внесення фунгіциду та інсектициду	Ридоміл Голд МЦ 68 WG, в.г. Карате Зеон 050 CS, мк. с.	2,5 кг/га 0,3 л/га	Інтервал через 8-10 днів	Застосування інсектициду на данному етапі розвитку рослин, буду залежать від прогнозу розвитку шкідників.
7	Ґрунтове застосування фунгіциду.	Юніформ 446 SE, CE	0,5 л/га	Інтервал Через 8-10 днів	Через системи краплинного зрошення.

8	<u>Третя обробка:</u> Внесення фунгіциду в баковій суміші з інсектицидами.	Квадріс Топ 325 SC, к. с.	1,0 л/га	Інтервал Через 10-12 днів	Застосування інсектициду на данному етапі розвитку рослин, буду залежать від прогнозу розвитку шкідників.
		Матч 050 EC, к. е.	0,4 л/га		
		Енжіо 247 SC, к.с.	0,3 л/га		
9	<u>Четверта обробка:</u> Внесення фунгіциду. Можливо поєднання з інсектицидом.	Прегадо R 270 WG, ВГ	5 кг/га	Інтервал Через 10-12 днів	Застосування інсектициду на данному етапі розвитку рослин, буду залежать від прогнозу розвитку шкідників.
10	<u>П'ята обробка:</u> Внесення фунгіциду в баковій суміші з інсектицидом.	Ридоміл Голд МЦ 68 WG, в.г.	2,5 кг/га	Інтервал Через 8-10 днів	
		Енжіо 247 SC, к.с.	0,3 л/га		
11	<u>Шоста обробка:</u> Внесення фунгіциду в баковій суміші з інсектицидом.	Квадріс 250 SC, к. с.	0,6 л/га	Інтервал Через 10-12 днів	
		Актеллік 500 EC, к. е.	1,0 л/га		
12	<u>Сьома обробка:</u> Внесення фунгіциду в баковій суміші з інсектицидом.	Ридоміл Голд МЦ 68 WG, в.г.	2,5 кг/га	Інтервал Через 12-14 днів	Вибір фунгіциду та норми їх витрати залежать від фіто санітарного стану посіву.
		Квадріс Топ 325 SC, к. с.	1,0 л/га		
		Карате Зеон 050 CS, мк. с.	0,3 л/га		

Перелік обов'язкових препаратів для використання в період вирощування цибулі

З метою отримання Товару (цибуля) з безпечним рівнем пестицидних залишків, захист цибулі повинен здійснюватись із застосуванням зазначених нижче препаратів. Нижче також зазначаються норми використання препаратів на гектар та їх внесення за відповідними фазами вегетації культури згідно з регламентом застосування:

Назва препарату	Норма л/ кг на 1 га	Кількість обробок у період вегетації	Фаза внесення	Термін очікування (кількість днів до збирання)	Спектор дії
Пергадо R	5	3	Обприскування в період вегетації	14	пероноспороз
Юніформ	0,5	2	У період вегетації з поливною водою через системи крапельного зрошення	7	Комплекс корневих захворювань (фузаріоз, пітіум, ризоктоніоз)
Ридоміл Голд МЦ	2,5	3	Обприскування в період вегетації	30	Несправжня борошниста роса
Квадріс Топ	1	3	Обприскування в період вегетації	14	Пероноспороз, альтернаріоз, стемфіліоз